GRANO de ORO™

КАТАЛОГ

ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ

ЗМІСТ

КОМПАНІЯ «GRANO DE ORO» — ЕКСПЕРТ В ГАЛУЗІ НАСІННИЦТВА 4

ПОРТФОЛІО 6

MATTIA 8

LION 9

ARCOS 10

SALAMANKA 11

SOLEXIS 12

LORCA CL 13

CADIZ 14

SANDER 15

ARSENIO 16

GRANO
de ORO

КОМПАНІЯ GRANO DE ORO — ЕКСПЕРТ В ГАЛУЗІ НАСІННИЦТВА

Одним з основних напрямків діяльності компанії є селекція та виробництво насіння. Ми займаємось виробництвом високоякісного посівного матеріалу та постійно розширюємо базу наших постачальників, обираючи найкраще насіння для українських аграріїв.

Наша сила — це дослідження та розробка в галузі нових гібридів соняшнику.

Отримання гарного врожаю починається з якісного виробництва насіння. Даному питанню насіннєва компанія Grano de Oro приділяє особливу увагу.

Важливе питання – це партнер, з яким закладаємо ділянки гібридизації.

Ми співпрацюємо з досвідченими виробниками в Іспанії та Італії, і це компанії, які вирощують насіння не тільки для компанії Grano de Oro, але і багатьом відомим насіннєвим брендам, що безумовно говорить про їх досвід та можливості забезпечити виконання умов договорів по вирощуванню насіння, що ми з ними укладаємо.

Наступний крок це узгодження всіх деталей виробництва насіння:

— вибір ділянки, попередника

— контроль просторової ізоляції

— термін посіву та гібрид, який буде вирощуватись саме на цій ділянці і саме в цьому регіоні

— узгодження схем посіву батьківських форм гібридів на ділянках гібридизації

— система захисту посіву

— система підживлення посіву

— кількість поливу, що дуже важливо для отримання якісного насіння

— система контролю за ділянками гібридизації

— сортові, біологічні та фітосанітарні прополювання, чому приділяється особлива увага (це має бути виконано вчасно та якісно)

— підготовка та безпосередній процес збирання.

Контроль за повнотою стерильності материнської лінії здійснюється за участі представника насіннєвої компанії Grano de Oro.

Вирощене насіння ми допрацьовуємо на сучасних насіннєвих лініях в Іспанії та Італії. При необхідності нанесення інсектицидного протруювання, часткову доробку насіння робимо з нашим партнером в Україні. Протруюванню насіння приділяємо особливу увагу. Воно має забезпечити надійний захист від хвороб та шкідників. Але для нас важливіше отримати здорове, чисте насіння з ділянки гібридизації. Що в парі з протруюванням дає значно кращий результат в вирощуванні гібридного соняшника. Це основні моменти які ми контролюємо, покращуємо та вдосконалюємо. Звичайно в полі все значно складніше. Але маючи надійних партнерів ми можемо виростити і запропонувати вам якісне насіння від насіннєвої компанії Grano de Oro.

Це нова лінійка гібридів соняшнику, новий продукт на аграрному ринку, що представлений трьома різновидами гібридів від компанії-виробника насіння Grano De Oro.

Це гібриди, які можна успішно вирощувати в різноманітних умовах.

Grano De Oro пропонує вам:

SALAMANCA, ARCOS, MATTIA, LION, ARSENIO, SANDER, SOLEXIS.

ПОРТФОЛІО ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ

GRANO de ORO™

ТЕХНОЛОГІЯ	ExpressSun				
НАПРЯМОК ВИКОРИСТАННЯ	Лінолевого типу				
НАЗВА ГІБРИДА	**MATTIA**	**LION**	**ARCOS**	**SALAMANCA**	**SOLEXIS**
ГРУПА СТИГЛОСТІ	середньостиглий	середньостиглий	середньостиглий	середньостиглий	середньопізній
РЕАКЦІЯ НА АГРОФОН	інтенсивний	помірно інтенсивний	інтенсивний	помірно інтенсивний	помірно інтенсивний
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА (РАСИ)	OR8	OR7+	OR7+	OR7+	OR7+
ДНІВ ДО ЗБИРАННЯ	110-115	110-112	115-120	110-115	115-120
ВИСОТА РОСЛИН, СМ	160-170	160-170	165-175	160-170	160-170
НАХИЛ КОШИКУ	нахилений	напівнахилений	нахилений	напівнахилений	напівнахилений
ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ Т/ГА	>5 т/га	>5 т/га	>5 т/га	>5 т/га	>5 т/га
ВМІСТ ОЛІЇ,%	49-54	49-54	50-54	49-54	48-51
ЕНЕРГІЯ ПОЧАТКОВОГОРОЗВИТКУ	9	9	9	9	9
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	9	9	9	9	9
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	8	8	8	9	7
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:					
фомопсису	8	7	8	7	8
склеротиніозу кошика	7	8	8	8	7
склеротиніозу стебла	8	8	8	8	7
іржі	8	8	8	8	8
пероноспорозу (НБР)	8	8	8	8	7
ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ					
для зони недостатнього зволоження	40-45 тис/га	40-45 тис/га	40-45 тис/га	40-45 тис/га	40-45 тис/га
для зони нестійкого зволоження	50-55 тис/га	50-55 тис/га	50-55 тис/га	50-55 тис/га	50-55 тис/га
для зони достатнього зволоження	50-55 тис/га	50-55 тис/га	50-55 тис/га	50-55 тис/га	50-55 тис/га
ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ					
Степ	+	+	+	+	+
Лісостеп	+	+	+	+	+
Полісся	+	+	+	+	+

ПОРТФОЛІО ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ

GRANO de ORO™

ТЕХНОЛОГІЯ	Clearfield			Класична
НАПРЯМОК ВИКОРИСТАННЯ	Лінолевого типу		Високоолеїнового типу	
НАЗВА ГІБРИДА	LORCA CL	CADIZ	SANDER	ARSENIO
ГРУПА СТИГЛОСТІ	середньостиглий	середньостиглий	середньостиглий	середньостиглий
РЕАКЦІЯ НА АГРОФОН	інтенсивний	інтенсивний	помірно інтенсивний	помірно інтенсивний
СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА (РАСИ)	OR7+	OR7+	OR6	OR7+
ДНІВ ДО ЗБИРАННЯ	110-120	110-120	110-115	110-115
ВИСОТА РОСЛИН, СМ	160-170	160-170	150-160	165-175
НАХИЛ КОШИКУ	нахилений	нахилений	напівнахилений	напівнахилений
ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ Т/ГА	>5 т/га	>5 т/га	>5 т/га	>5 т/га
ВМІСТ ОЛІЇ, %	>50	>50	48-50	48-50
ВМІСТ ОЛЕЇНОВОЇ КИСЛОТИ, %			90-92	86-91
ЕНЕРГІЯ ПОЧАТКОВОГОРОЗВИТКУ			9	8
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ			9	9
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ			8	7
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:				
фомопсису			7	8
склеротиніозу кошика			8	8
склеротиніозу стебла			8	7
іржі			7	8
пероноспорозу (НБР)			7	8
ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ				
для зони недостатнього зволоження	40-45 тис/га	40-45 тис/га	40-45 тис/га	40-45 тис/га
для зони нестійкого зволоження	50-55 тис/га	50-55 тис/га	50-55 тис/га	50-55 тис/га
для зони достатнього зволоження	50-55 тис/га	50-55 тис/га	50-55 тис/га	50-55 тис/га
ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ				
Степ	+	+	+	+
Лісостеп	+	+	+	+
Полісся	+	+	+	+

MATTIA

ExpressSun, OR8

Лінолевий ExpressSun гібрид з ефективним контролем вовчка до 8 РАС

- ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ БІЛЬШЕ 5 Т/ГА
- ВИСОКИЙ ВИХІД ОЛІЇ
- ІДЕАЛЬНА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ
- ВИСОКА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В разі потреби використовувати в зонах значного поширення вовчку соняшникового. Максимальна одноразова норма використання гербіциду Експрес 75 в.г.-50г

Підходить для вирощування у всіх регіонах.

На полях, уражених іржею, при сприятливих для хвороби умовах обов'язково використовувати фунгіцидний захист.

В зоні Лісостепу для досягнення максимального врожаю використовувати фунгіцидний захист.

В зоні Полісся обовязковий 2-х разовий фунгіцидний захист.

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ:

Для зони недостатнього зволоження – 40-45 тис/га
Для зони нестійкого зволоження – 50-55 тис/га
Для зони достатнього зволоження – 50-55 тис/га

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

ФОМОПСИСУ	8
СКЛЕРОТИНІОЗУ СТЕБЛА	8
СКЛЕРОТИНІОЗУ КОШИКА	7
ІРЖІ	8
ПЕРОНОСПОРОЗУ (НБР)	8

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА QR КОДОМ

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

СТЕП | ЛІСОСТЕП | ПОЛІССЯ

49-54%
ОЛІЙНІСТЬ

середньостиглий
ГРУПА СТИГЛОСТІ

110-115
ДНІВ ДО ЗБИРАННЯ

>5 т/га
ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

інтенсивний
ТИП

нахилений
НАХИЛ КОШИКА

160-170
ВИСОТА РОСЛИНИ

ЕНЕРГІЯ ПОЧАТКОВОГО РОЗВИТКУ	9
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	9
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	8

LION

ExpressSun, OR7+

Посухостійкість та адаптивність у всіх кліматичних зонах

- ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ БІЛЬШЕ 5 Т/ГА
- ДАЄ МАКСИМАЛЬНИЙ ВМІСТ ОЛІЇ
- ВИСОКА ЕНЕРГІЯ ПОЧАТКОВОГО РОСТУ
- СТІЙКИЙ ДО ВОГНІВКИ СОНЯШНИКОВОЇ
- ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ У ВСІХ КЛІМАТИЧНИХ ЗОНАХ

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В разі потреби використовувати в зонах значного поширення вовчку соняшникового. Максимальна одноразова норма використання гербіциду Експрес 75 в.г.-50г

Вирощування у всіх регіонах та в умовах жаркого, сухого клімату.

На полях, уражених іржею, при сприятливих для хвороби умовах обов'язково використовувати фунгіцидний захист.

В зоні Лісостепу для досягнення максимального врожаю використовувати фунгіцидний захист.

В зоні Полісся обов'язковий 2-х разовий фунгіцидний захист.

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ:

Для зони недостатнього зволоження – 40-45 тис/га

Для зони нестійкого зволоження – 50-55 тис/га

Для зони достатнього зволоження – 50-55 тис/га

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

ФОМОПСИСУ	7
СКЛЕРОТИНІОЗУ СТЕБЛА	8
СКЛЕРОТИНІОЗУ КОШИКА	8
ІРЖІ	8
ПЕРОНОСПОРОЗУ (НБР)	8

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА QR КОДОМ

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

СТЕП | ЛІСОСТЕП | ПОЛІССЯ

49-54% ОЛІЙНІСТЬ

середньостиглий ГРУПА СТИГЛОСТІ

110-112 ДНІВ ДО ЗБИРАННЯ

помірно інтенсивний ТИП

>5 т/га ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

напівнахилений НАХИЛ КОШИКА

160-170 ВИСОТА РОСЛИНИ

ЕНЕРГІЯ ПОЧАТКОВОГО РОЗВИТКУ	9
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	9
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	8

ARCOS

ExpressSun, OR7+

Надійний захист від вовчка за рахунок генетичної стійкості

- ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ ЗАПОБІГАЄ ВТРАТІ ВРОЖАЙНОСТІ
- СТАБІЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ВРОЖАЙНОСТІ, ЩО ПЕРЕВИЩУЄ 5 Т/ГА
- ВРАЖАЮЧИЙ ВМІСТ ОЛІЇ > 50-54%
- ЛІНОЛЕВИЙ ГІБРИД ПІД ЕКСПРЕС ТЕХНОЛОГІЮ
- МАКСИМАЛЬНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО БАГАТЬОХ ХВОРОБ

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В разі потреби використовувати в зонах значного поширення вовчку соняшникового. Максимальна одноразова норма використання гербіциду Експрес 75 в.г.-50г

Підходить для вирощування у всіх регіонах.

На полях, уражених іржею, при сприятливих для хвороби умовах обов'язково використовувати фунгіцидний захист.

В зоні Лісостепу для досягнення максимального врожаю використовувати фунгіцидний захист.

В зоні Полісся обов'язковий 2-х разовий фунгіцидний захист.

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ:

Для зони недостатнього зволоження – 40-45 тис/га

Для зони нестійкого зволоження – 50-55 тис/га

Для зони достатнього зволоження – 50-55 тис/га

> 50-54% ОЛІЙНІСТЬ

середньостиглий ГРУПА СТИГЛОСТІ

115-120 ДНІВ ДО ЗБИРАННЯ

інтенсивний ТИП

>5 т/га ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

нахилений НАХИЛ КОШИКА

165-175 ВИСОТА РОСЛИНИ

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

ФОМОПСИСУ	8
СКЛЕРОТИНІОЗУ СТЕБЛА	8
СКЛЕРОТИНІОЗУ КОШИКА	8
ІРЖІ	8
ПЕРОНОСПОРОЗУ (НБР)	8

ЕНЕРГІЯ ПОЧАТКОВОГО РОЗВИТКУ	9
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	9
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	8

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

СТЕП | ЛІСОСТЕП | ПОЛІССЯ

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА QR КОДОМ

SALAMANCA

ExpressSun, OR7+

Стабільний та надійний середньостиглий гібрид під Експрес технологію

- ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ БІЛЬШЕ 5 Т/ГА
- КОНТРОЛЬ ВОВЧКА ДО 7+ РАС
- ВИТРИВАЛИЙ ТА НЕ ВИБАГЛИВИЙ ДО АГРОФОНУ
- ГЕНЕТИЧНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ, НЕЗАЛЕЖНА ВІД ВПЛИВУ СЕРЕДОВИЩА
- ВИСОКИЙ ВМІСТ ОЛІЇ
- ВИСОКА ЕНЕРГІЯ ПОЧАТКОВОГО РОСТУ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЄ ЗДАТНІСТЬ РОСЛИНИ ФОРМУВАТИ ДРУЖНІ ТА ВИРІВНЯНІ СХОДИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В разі потреби використовувати в зонах значного поширення вовчку соняшникового. Максимальна одноразова норма використання гербіциду Експрес 75 в.г.-50г

Підходить для вирощування у всіх регіонах.

На полях, уражених іржею, при сприятливих для хвороби умовах обов'язково використовувати фунгіцидний захист.

В зоні Лісостепу для досягнення максимального врожаю використовувати фунгіцидний захист.

В зоні Полісся обов'язковий 2-х разовий фунгіцидний захист

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ:

Для зони недостатнього зволоження – 40-45 тис/га

Для зони нестійкого зволоження – 50-55 тис/га

Для зони достатнього зволоження – 50-55 тис/га

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

ФОМОПСИСУ	7
СКЛЕРОТИНІОЗУ СТЕБЛА	8
СКЛЕРОТИНІОЗУ КОШИКА	8
ІРЖІ	8
ПЕРОНОСПОРОЗУ (НБР)	8

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА QR КОДОМ

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

СТЕП | ЛІСОСТЕП | ПОЛІССЯ

49-54%
ОЛІЙНІСТЬ

середньостиглий
ГРУПА СТИГЛОСТІ

110-115
ДНІВ ДО ЗБИРАННЯ

помірно інтенсивний
ТИП

>5 т/га
ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

напівнахилений
НАХИЛ КОШИКА

ЕНЕРГІЯ ПОЧАТКОВОГО РОЗВИТКУ	9
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	9
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	9

160-170
ВИСОТА РОСЛИНИ

SOLEXIS

ExpressSun, OR7+

Середньопізній ExpressSun гібрид лінолевого типу

- ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ БІЛЬШЕ 5 Т/ГА
- СТІЙКИЙ ДО ПОСУХИ ТА ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
- СИЛЬНА ГЕНЕТИКА
- СТІЙКИЙ ДО ВИЛЯГАННЯ
- ВИСОКИЙ ВМІСТ ОЛІЇ ТА ЇЇ ГАРНА ЯКІСТЬ

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

В разі потреби використовувати в зонах значного поширення вовчку соняшникового. Максимальна одноразова норма використання гербіциду Експрес 75 в.г.-50г

Підходить для вирощування у всіх регіонах.

На полях, уражених іржею, при сприятливих для хвороби умовах обов'язково використовувати фунгіцидний захист.

В зоні Лісостепу для досягнення максимального врожаю використовувати фунгіцидний захист.

В зоні Полісся обов'язковий 2-х разовий фунгіцидний захист.

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ:

Для зони недостатнього зволоження – 40-45 тис/га

Для зони нестійкого зволоження – 50-55 тис/га

Для зони достатнього зволоження – 50-55 тис/га

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

ФОМОПСИСУ	8
СКЛЕРОТИНІОЗУ СТЕБЛА	7
СКЛЕРОТИНІОЗУ КОШИКА	7
ІРЖІ	8
ПЕРОНОСПОРОЗУ (НБР)	7

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА QR КОДОМ

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

СТЕП | ЛІСОСТЕП | ПОЛІССЯ

48-51% ОЛІЙНІСТЬ

середньопізній ГРУПА СТИГЛОСТІ

115-120 ДНІВ ДО ЗБИРАННЯ

помірно інтенсивний ТИП

>5 т/га ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

напівнахилений НАХИЛ КОШИКА

160-170 ВИСОТА РОСЛИНИ

ЕНЕРГІЯ ПОЧАТКОВОГО РОЗВИТКУ	9
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	9
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	7

(в реєстрації)

LORCA CL

Clearfield, OR7+

Clearfield гібрид лінолевого типу використання

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ БІЛЬШЕ 5 Т/ГА

ВИСОКИЙ ВМІСТ ТА ЯКІСТЬ ОЛІЇ В НАСІННІ, БІЛЬШЕ 50%

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Підходить для вирощування у всіх регіонах.

На полях, уражених іржею, при сприятливих для хвороби умовах обов'язково використовувати фунгіцидний захист.

В зоні Лісостепу для досягнення максимального врожаю використовувати фунгіцидний захист.

В зоні Полісся обов'язковий 2-х разовий фунгіцидний захист.

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ:

Для зони недостатнього зволоження – 40-45 тис/га

Для зони нестійкого зволоження – 50-55 тис/га

Для зони достатнього зволоження – 50-55 тис/га

- ЕНЕРГІЯ ПОЧАТКОВОГО РОЗВИТКУ
- ПОСУХОСТІЙКІСТЬ
- СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

- ФОМОПСИСУ
- СКЛЕРОТИНІОЗУ СТЕБЛА
- СКЛЕРОТИНІОЗУ КОШИКА
- ІРЖІ
- ПЕРОНОСПОРОЗУ (НБР)

>50% ОЛІЙНІСТЬ

середньостиглий ГРУПА СТИГЛОСТІ

110-120 ДНІВ ДО ЗБИРАННЯ

інтенсивний ТИП

>5 т/га ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

напівнахилений НАХИЛ КОШИКА

160-170 ВИСОТА РОСЛИНИ

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

СТЕП | ЛІСОСТЕП | ПОЛІССЯ

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА QR КОДОМ

(в реєстрації)

CADIZ

Clearfield, OR7+

Clearfield гібрид лінолевого типу використання

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ БІЛЬШЕ 5 Т/ГА

ВИСОКИЙ ВМІСТ ТА ЯКІСТЬ ОЛІЇ В НАСІННІ, БІЛЬШЕ 50%

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Підходить для вирощування у всіх регіонах.

На полях, уражених іржею, при сприятливих для хвороби умовах обов'язково використовувати фунгіцидний захист.

В зоні Лісостепу для досягнення максимального врожаю використовувати фунгіцидний захист.

В зоні Полісся обов'язковий 2-х разовий фунгіцидний захист.

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ:

Для зони недостатнього зволоження – 40-45 тис/га

Для зони нестійкого зволоження – 50-55 тис/га

Для зони достатнього зволоження – 50-55 тис/га

ЕНЕРГІЯ ПОЧАТКОВОГО РОЗВИТКУ	
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

ФОМОПСИСУ	
СКЛЕРОТИНІОЗУ СТЕБЛА	
СКЛЕРОТИНІОЗУ КОШИКА	
ІРЖІ	
ПЕРОНОСПОРОЗУ (НБР)	

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

СТЕП	ЛІСОСТЕП	ПОЛІССЯ

>50%
ОЛІЙНІСТЬ

середньостиглий
ГРУПА СТИГЛОСТІ

110-120
ДНІВ ДО ЗБИРАННЯ

інтенсивний
ТИП

>5 т/га
ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

напівнахилений
НАХИЛ КОШИКА

160-170
ВИСОТА РОСЛИНИ

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА QR КОДОМ

SANDER

Clearfield, OR6

Високоолеїновий Clearfield гібрид

- ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ БІЛЬШЕ 5 Т/ГА
- ВИСОКИЙ ВМІСТ ОЛЕЇНОВОЇ КИСЛОТИ
- ПЛАСТИЧНИЙ ДО РІЗНИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ
- НИЗЬКОРОСЛИЙ ГІБРИД З ВИСОКОЮ СТІЙКІСТЮ ДО ВИЛЯГАННЯ
- ВИСОКИЙ ВМІСТ ОЛІЇ
- СИЛЬНИЙ ІМУНІТЕТ, ЯКИЙ ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ ЕФЕКТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЛИСТОСТЕБЛОВИХ ХВОРОБ

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Підходить для вирощування у всіх регіонах.

На полях, уражених іржею, при сприятливих для хвороби умовах обов'язково використовувати фунгіцидний захист.

В зоні Лісостепу для досягнення максимального врожаю використовувати фунгіцидний захист.

В зоні Полісся обов'язковий 2-х разовий фунгіцидний захист.

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ:

Для зони недостатнього зволоження – 40-45 тис/га

Для зони нестійкого зволоження – 50-55 тис/га

Для зони достатнього зволоження – 50-55 тис/га

ЕНЕРГІЯ ПОЧАТКОВОГО РОЗВИТКУ	9
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	9
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	8

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА QR КОДОМ

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

ФОМОПСИСУ	7
СКЛЕРОТИНІОЗУ СТЕБЛА	8
СКЛЕРОТИНІОЗУ КОШИКА	8
ІРЖІ	7
ПЕРОНОСПОРОЗУ (НБР)	7

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

СТЕП | ЛІСОСТЕП | ПОЛІССЯ

48-50% ОЛІЙНІСТЬ

90-92% ВМІСТ ОЛЕЇНОВОЇ КИСЛОТИ

середньостиглий ГРУПА СТИГЛОСТІ

110-115 ДНІВ ДО ЗБИРАННЯ

помірно інтенсивний ТИП

>5 т/га ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

напівнахилений НАХИЛ КОШИКА

150-160 ВИСОТА РОСЛИНИ

ARSENIO

Класичний, OR7+

Високоолеїновий гібрид з класичною технологією вирощування

- ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ БІЛЬШЕ 5 Т/ГА
- ВИСОКИЙ ВМІСТ ОЛЕЇНОВОЇ КИСЛОТИ
- СТІЙКИЙ ДО ВОВЧКА 7+ РАС
- МАЄ ДОБРЕ РОЗВИНЕНУ КОРЕНЕВУ СИСТЕМУ
- ВИСОКИЙ ВМІСТ ТА ЯКІСТЬ ОЛІЇ В НАСІННІ
- ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВИСОКОЮ ТОЛЕРАНТНІСТЮ ДО БАГАТЬОХ ПОШИРЕНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛИСТЯ І КОШИКА

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Підходить для вирощування у всіх регіонах.

На полях, уражених іржею, при сприятливих для хвороби умовах обов'язково використовувати фунгіцидний захист.

В зоні Лісостепу для досягнення максимального врожаю використовувати фунгіцидний захист.

В зоні Полісся обов'язковий 2-х разовий фунгіцидний захист.

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ:

Для зони недостатнього зволоження – 40-45 тис/га

Для зони нестійкого зволоження – 50-55 тис/га

Для зони достатнього зволоження – 50-55 тис/га

ЕНЕРГІЯ ПОЧАТКОВОГО РОЗВИТКУ	8
ПОСУХОСТІЙКІСТЬ	9
СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ	7

ВРОЖАЙНІСТЬ ЗА QR КОДОМ

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО:

ФОМОПСИСУ	8
СКЛЕРОТИНІОЗУ СТЕБЛА	7
СКЛЕРОТИНІОЗУ КОШИКА	8
ІРЖІ	8
ПЕРОНОСПОРОЗУ (НБР)	8

48-50% ОЛІЙНІСТЬ

середньостиглий ГРУПА СТИГЛОСТІ

110-115 ДНІВ ДО ЗБИРАННЯ

помірно інтенсивний ТИП

86-91% ВМІСТ ОЛЕЇНОВОЇ КИСЛОТИ

>5 т/га ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ

напівнахилений НАХИЛ КОШИКА

165-175 ВИСОТА РОСЛИНИ

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ

СТЕП | ЛІСОСТЕП | ПОЛІССЯ

НОТАТКИ

GRANO de ORO™

НОТАТКИ

GRANO™
de ORO

granodeoroukraine@gmail.com
granodeoro.sp.pl@gmail.com

+38 (067) 240 24 14
+38 (067) 232 78 28
+38 (097) 291 76 62

granodeoro.com.ua

instagram

facebook

tiktok